



# QUÆSTIO MEDICA,

PRO BACCALAUREATU

MANE DISCUTIENDA

In almâ Monspeliensium Medicorum Academiâ

P R Æ S I D E

Illustrissimo viro R. D. JOANNE CHASTELAIN,  
Regis Consiliario & Medico, nec-non in almâ Monspeliensium Medicorum Academiâ Professore Regio dignissimo, ac Decano plurimum venerando.

SUB HAC VERBORUM SERIE.

*An Phthisi Pulmonari mutatio aëris?*

**P**HTHISIM tractaturus paucis in limine duco notandum, illam in genere in atrophîâ, aut corporis extenuatione, quacumque ex causâ introductâ, consistere. Quoniam verò universalium phthiseos specierum exactâ descriptio præfixos Theseos limites excedit, hîc tantum in specie de eâ corporis extenuatione seu atrophîâ, quæ à vitio pulmonum provenit, & phthisis pulmonaris dicitur, agemus, ejusdemque naturam & curationem breviter tractabimus. Hæc autem spectato nomine, optimè definitur, extenuatio totius corporis, quæ ulcus, abcessum, aut tubercula pulmonum mollia, & febrem lentam ex illis ortam consequitur.

Malè dividitur à quibusdam in imminens, incipientem, & confirmatam; siquidem phthisis imminens haudquaquam phthiseos nomine insigniri potest,

unde melius illam distribuimus in incipientem, & confirmatam, in quibus scilicet genuini phthisicos characteres se produnt; fatendum tamen primam divisionem apud practicos levioris momenti non esse, quandoquidem phthisi imminenti occurrendo, occurritur quoque incipienti, & confirmandæ.

Mos etiam invaluit apud medicinarum principes, eam in primariam & secundariam distribuere, nos ut nobis ubique constemus & aliquatenus eorum vestigiis insistamus, primariam vocamus, non eorum more illam tantum, quæ solum ab ulcere pulmonum, verum etiam illam quæ ab abcessibus aut tuberculis mollibus procedit, & secundariam cum omnibus, quæ ab aliis morbis præcedentibus v. g. ab anginâ, peripneumoniâ, aliisque bene multis dependet; cum tantorum virorum bonâ veniâ, etsi phthisis pulmonaris à solo pulmonum ulcere immediatè oriretur, minus exacta esset ipsorum divisio, omne enim ulcus præsupponit solutionem continui, quæ formalem morbi rationem sibi vendicat.

Veteres plerumque originem mali catharris à capite ad asperam arteriam & hinc in pulmones defluentibus adscribere non dubitarunt, verum minus rectè, siquidem ex observationibus Anatomicis constat, nihil seri à cerebro per glandulam pituitariam in pectus aut palatum, sed per peculiare ductus ad venas jugulares defferri.

Causam immediatam hujus mali quod spectat, consistit hæc in miasmatis salinis heterogeneis, quæ sanguini pulmones præterfluenti ab abcessu, ulcere, aut tuberculis mollibus suppeditantur, undè necessariò fit motus febrilis, à quo carminantur sulphura, serum dissipatur & extricantur salia, sicque succus nutritivus acrimoniam contrahit, & phthisis oboritur.

Inter causas antecedentes recensentur materiæ acres & corrosivæ, quæ interdum cum aère inspirantur, ut sunt effluvia corrosiva & contagiosa, materiæ chemicæ, calc &c. Modò etiam cum alimentis ingeruntur, & unâ cum chylo sanguini affunduntur, moxque cum humore tracheali aut bronchiorum unitæ, pulmonum exulcerationem efficiunt, hinc ab esu leporis marini excitatur phthisis, ut testis est Fernellius.

Ut plurimum tamen talis materia in sanguine existit, sive acida sit, sive alcalina, vel ex his ambobus conflata, undè fibræ pulmonares discinduntur, canaliculi & tubuli disrumpuntur & sanguis & lymphæ, imò & ipsæ partes solidæ in pus vel saniem corrodentem transmutantur.

Materia hæc modo est lymphæ acris & mordax, modò sanguis extravasatus & corruptus, ut accidit à sanguinis sputo, peripneumoniâ, aut pulmonis vomicâ introrsum ruptâ, ubi à vasorum dilatatione & rupturâ fiunt tumores à distendentibus, putrefactiones ab extravasatis vel stagnantibus humoribus, quod, ut exponamus, nostri jam postulat ratio instituti.

Quamdiù nimirum in machinâ nostrâ pneumatico-hydraulicâ solidas inter & fluidas partes debitum servatur æquilibrium, ita ut sanguis quantitate & impetû momento, cum vasorum ambientium capacitate, tono, elatere, hydrostaticè respondeat, sanguinem motu æquali & libero à corde tanquam à centro ad corporis peripheriam, & ab hac vicissim ad centrum inoffenso cursu circuire necesse est.

Quam primùm verò mutua illa sanguinem inter & vasa proportio tollitur, ita ut ob partem alicubi obstructam, vel spasmodicè contractam, sanguinis in aliis partibus copia & impetus augeantur, mutari quoque sanguinæ circulationis æquilibrium oportet: cum enim sanguis systole cordis ejectus aortæ ramis omnibus proportione debitâ sit commensuratus, ab iis major copia ob resistantiam & spatii defectum excipi non potest, quare si quâ de causâ sanguinis cursus alicubi impeditur, necessariò fit expressio ad vasa magis libera, quibus si pondere & orgasmo vim faciat, eorumque resistantiam superet, quâ data via foras erumpet, quemadmodum in ingentibus aquarum eluvionibus fortè contingit in macrocosmo, cum nimirum subterranei aquarum vortices à jugi maris refluente & affluentis pressione propulsi, & per consuetos ductus ut potè obstructos transire nescii, vorticoso motu refluunt, & per alios apertos canales impetuose sese præcipitando, exitiosa hinc inde diluvia terris infundunt.

Dum etiam quantitate excedit sanguis, deficiunt ob nimiam pressionem à suo elatere partes solidæ, à quo potissimum juvatur cursus fluidorum, in angustiis maximè tubulorum mæandris intercipitur, unde congestiones, ruptiones, extravasationes.

Neque sanguinem aliosque humores præcisè quantitate, qualitate, aut quantitate & qualitate simul, semper phthisim minari statuimus, nisi ad vasorum apertionem à sanguine extravasato & stagnante accedat inflammatio, erosio, putredo, febris; non raro etiam fit suppressâ evacuatione aliquâ aut opprimente in vasis pulmonis sanguinis fervidissimi copiâ, suppressus enim tunc sanguis & ab effluxu prohibitus aliquandò concrevit & vasa dirumpit, aliquandò acrimoniam celerrimè contrahit, sæpissimè etiam diabrôsis, idest vasorum ipsiusque pulmonum substantiæ erosio acris humoris extravasati soboles, maximè si corporibus infirmis cachecticis aut inveteratâ viscerum atoniâ infarctu laborantibus accidit, phthisi ansam præbere solet, nisi ociùs deterfo & ad cicatricem perducto ulcere fluxio sistatur.

Humoris quoque trachealis per glandulas nimiam quantitate secretio & acrimonia à salium nunc volatilium nunc fixorum excessu orta, præternaturales ejusmodi fluxiones fovete, efficere, & augere solet.

Ad quod multùm conducit vitium prædictarum glandularum, quando v. g. pori ac tubuli justo ampliores redduntur, vel à flacciditate fibrillarum in tubulis existentium, vel à connatâ aliquâ dispositione flacciditatem fibrillis pororum præcipuè inducit, sive humoris affluentis copia, sive defectus spirituum animalium, propter quem prædictæ fibræ tono suo ita orbantur, ut particulis circulationis ope appellere consuetis, amplius resistere non valeant.

Tandem serum copiosum in massâ humorali abundans, sicubi eam fuerit nactum texturam, ut facilius per glandulas bronchiales, quàm per alias quasvis transcolari queat, amplitudinem quoque pororum & ductuum efficere debet, quatenus guttæ illæ serosæ ac lymphaticæ, à continuò succedentibus aliis in suæ secretionis negotio jugiter protrusæ, portas magis

pandunt, vasque consueta plus distendunt. Cui causæ remotæ insensibilis transpiratio retenta, occasionem aliquandò præbere potest.

Quòd si lymphæ in glandulis pulmonaribus secernenda, glutinosa, tenax, & viscida sit, ita ut tubulos glandulasque oppleat & infarciat, fient tubercula quæ pro majore aut minore materiæ crassitie, nunc duriora nunc molliora existunt, undè crescente intestino particularum motu præterfluenti sanguini suppeditantur miasmata quæ fermentationis luctam cum salibus heterogeneis ineunt, & phthisim producere apta nata sunt.

Si verò lymphæ etiamnum per glandulas secreta fibrillas quandòque nervosas pungat, hincque tubuli excretorii (accedente forsàn simul externi aëris frigore, aliâve causâ occasionali) constringantur, tum moram trahente lymphâ, tubercula in spongiosâ pulmonum substantiâ efflorescunt, nisi humor stagnans tubulorum excretoriorum ostiola vi quâdam perumpat, atque ita sibi exitum parat, sin verò lymphæ magis acris & corrosiva fuerit, tum pulmonum corrosionem & exulcerationem efficiet.

Remotissimas causas arbitramur abusum rerum non naturalium, talis est potus frigidus copore præcipuè calenti ingestus, qui fibras subito constringendo, & sanguinem coagulando inæqualem sanguinis circulationem reddere, & phthisim modo hætenus descripto concitare potest.

Motus corporis vehemens quo sanguis fortiter exprimitur è canaliculis & meatibus partium solidarum oscillantium in canaliculos & meatus aliarum partium pariter oscillantium, undè sicubi in angustiis tubulis lateat quædam obstructio à plethora, cacochymia, tumor, spasmus, sanguis liberè moveri impotens, cum impetu eò pellitur, ubi amplius spatium suppetit, & minor adest resistentia ex legibus motûs hydraulici, sic vasa pneumatica facillè rumpi posse neminem latet.

Potest etiam sola sanguinis quantitas, turgescencia à nimio corporis motu, vino copioso, spirituofo assumpto, animi pathematis, &c. introducta corpore cæteroquin sano phthisim efficere, quatenus sanguis in minimos tubulos impulsus copiâ & impetu seipsum impedit & ibidem obice factò subsistit, cum è contra si lentè procederet facillimè flueret, etiam per exilissimos tubulorum anfractus, non secus, ac contingit in densâ hominum turbâ dum per portam unâ omnes transire omni opera contendunt, agmine præ foribus constipato, exitus universis præcluditur, quorum singulis modestè exeuntibus nullum esset impedimentum.

Vigiliæ nimix serum sanguinis absorbunt & acriorem reddunt, item incubationes nocturnæ frequentiores, accedunt fuligines candelarum nimium inspiratæ, à quibus oscula ductuum excretoriorum adstringuntur & sanguis crassior redditur, undè similem effectum sortiuntur.

Inter animi pathemata contribuunt ira, gaudium, terror, metus, & tristitia moderationis diuites excedentia, quoniam coctiones atque secretiones labefactant, & sanguinem obstructioni aptum aut acrem reddunt.

Antecedunt quandòque ex rebus præternaturalibus hæreditaria vel adventia pulmonum atonia & debilitas, eorumque mala conformatio, cum pleurâ cohesio, hæc spectant collum oblongum, scapulæ alarum instar pro-

minentes, pectus angustum & depressum, vox clangosa item vociferatio, cantus musicus, suppressio hæmorrhagiæ narium, mensium, hæmorrhoidum, scabies, exanthemata retropulsa, hypocondriaca, scorbutica affectio, cachexia, rheumata, internarum partium inflammationes, variolæ, morbilli, contusiones, casus ab alto, quemadmodum observationes practicæ cadaverum phthisi defunctorum sectiones, & quotidiana experientia satis testantur.

Juvenes mediæ ætatis præ aliis obnoxii sunt huic affectui; ab anno 18. ad 35. quos tibi opportunos asserit Hyp. Aphor. 9. sect. 5. *Tabes iis maxime ætatibus fit, quæ ab anno decimo octavo sunt ad trigesimum quintum*, ratio est quia tunc vasa incrementi apicem adeptæ, ulteriori productioni suæ resistunt, dum interim cruoris adaugentur copia acrimonia & impetus; cum autem in pueris laxior sit corporis externi habitus, major sit sanguinis expressio à centro ad peripheriam & ob minorem hinc resistentiam sanguis erumpit ex arteriolis & venulis per tunicam narium dispersis; dum verò firmiter evadit vasorum structura magisque vividus fibrarum cutanearum tonus in juvenibus, *ex quo sollicitat tenerum jam pronuba flamma pudorem*, & vocem asperiores edere cæperunt puberes, densiori redditâ superficie corporis ab extrò introrsum magis refluit sanguis, ubi à vehementioribus exercitiis, vino assumpto spirituosò, irâ, amore, aliisque orgasticè commotus, per pulmones erumpit, quorum spongiosa substantia, & à continuis agitationibus fatigata humorum orgasmo, minus ac aliæ partes resistit. Postquam tandem defervescit juvenilis impetus, & à negotio ad otium, à motu ad quietem seu vitam sedentariam componitur corpus in viris & senibus, difficilior fit fluidorum circuitus per universa viscera, quæ per hæmorrhoides internas aut externas sanguine superfluo, plerumque tamen in provectâ ætate, exonerantur.

Hyeme & vere incunte potissimum, fiunt phthises; aër enim hybernus & frigidus, fibras cutaneas spasmodicè contrahendo, facit ut major fiat repulsio sanguinis à superficie ad centrum: cumque idem aër frigidus respiratione hians tenerrimam pulmonum substantiam constringat humoresque inspillet fit seri ac lymphæ expressio, sanguinis coagulatio, & vasorum pulmonarium apertio.

Ast verò incunte vere dum aër magis incalescit, principia fermentativa crassa & in sanguinè per hyemem coacervata, in motum concitantur, & sanguis acrior redditur, hinc facillimè in laxatâ adhuc pulmonum compage contingunt ruptiones, extravasationes, corrosiones.

symptomata quod spectat, ea facilè ex assignatis causis deduci posse arbitramur. Et 1<sup>o</sup>. Quidem fit totius corporis consumptio, quia major fit dissipatio quam restauratio, propter febris æstum, & defectum aut corruptionem succi nutritii, quoniam contaminantur fermenta à miasmatis ab ulcere aut tuberculis effluentibus, & salibus acris in sanguine latitantibus, hinc succus nutritivus acrior factus, exedit arque abradit potius gelatinam partibus appositam.

Febris dependet à miasmatis ab ulcere, abcessu, aut tuberculis pulmonum emanantibus, quæ texturæ sanguinis, cum sint aliena, cum corpus;

culis in sanguine contentis concurrunt & congregantur, sicque motum febrilem excitant.

Febris est lenta, quia miasmata ab ulcere, abcessu, aut tuberculis pulmonum, sanguini suppeditata in minori sunt copiâ, quam ut fermentationem sanguinis multum intendere possint.

Horrorem duabus à partu horis supervenientem, deducimus à sero salso membranas irritante & spirituum animalium influxu in fibras musculosas; chylus enim affusus sanguini fermentationis motum obtundit & sanguinem coagulat, hinc serum expressum in membranas irruit, eas laceffit & spiritus ad refluxum & influxum cogit.

Pulsus parvus repetitur à modicâ quantitate cruoris singulis contractionibus à sinistro cordis ventriculo in aortam propulsi, ob minorem energiam fluidi cordis motivi, ad contractiones totales exercendas.

Pulsus etiam debilis est, quia cor debiliter contrahitur; quoniam verò cor suo elatere citò sese restituit ob celerem hujusce fluidi discussionem, aliaque ejusdem portio prestò est ad systolem denuò inchoandam, hinc pulsus frequentia, ad breves vibrationes breve tempus requiritur.

Tussis provenit ab irritatione membranæ tracheæ arteriæ & bronchiorum inductâ à salibus à pulmonibus elevatis, aut cum humore tracheali sequestratis, undè propter refluxum spirituum ad emporium & influxum in musculos expirationi dicatos, excitatur convulsivus thoracis motus, & tussis quæ pro diversitate materiæ per tussim ejectæ, nunc purulenta, nunc sanguinolenta, modo lymphatica, vel dum nihil ferè ejicitur, sicca vocatur; purulenta est tussis quando pus è vesiculis pulmonaribus unâ cum aëre expellitur, sanguinolenta dum sanguis extravasatus sursùm fertur, lymphatica, quando serum lymphaticum propter infarctum pulmonum in vesiculas demissum è pulmonibus evolvitur, denique inter tussendum nihil ferè ejicitur, dum materia excernenda propter tenacitatem vim aëris eludit, aut propter tenuitatem sub formâ vaporis elevatur.

Adest difficultas respirandi quia propter pulmonum infarctum & compressionem vesicularum denegatur aëri ingressus, hinc thorax difficulter attollitur; illa verò per intervalla intenditur prout sanguinis motus & crassities à rebus non naturalibus augetur, accidente etiam imbecillitate virium, pectoris gravitas contingit.

Decidunt capilli quoniam eroduntur radices à succo quo nutriuntur nimis acri.

Incurvantur ungues à retractis fibris, consumptis videlicet partibus carnosis unguibus subjectis.

Supervenit diarrhæa, quoniam humores acres & mordaces à sanguine deliquium passo unâ cum fermento per glandulas intestinales secernuntur, atque à cruditatibus in primis viis fibræ nervæ irritantur, sicque intestina ad crebras & vehementiores contractiones peristalticas, à spiritibus influentibus in fibras eorum orbiculares adiguntur.

Convulsiones aut motus convulsivi repetantur ab irregulari influxu spirituum in partes, propter irregularem mixtionem partium heterogenearum in

tempore, hinc expansio inæqualis, quam similiter influxus inæqualis sequitur.

Urinæ interdum rubent ob diuturnum sanguinis æstum; oleaginosa evadunt à colliquatâ pinguedine unâ cum lotio secretâ, si verò urinæ aliquando observentur purulentæ, ut nonnulli referunt authores, pus circulationis ope, per glandulas renales excerni necesse est.

Intumescunt pedes, quoniam deficiente partium tono ob spirituum penuriam & minorem cordis vim ad sanguinis è partibus infernis reductionem, iste in ipsis stagnat & serum dimittit in interstitia fibrarum musculosarum.

Genarum rubor à sanguine, in cutis supra os malum extensæ texta, hærente, eoque in suis globulis valdè diviso & proinde rutilo, dependet; hæret autem potissimum hæc in parte sanguis ob tensionem cutis supra os malum, in umbonem quasi ipsam elevans, ejusque per consequens vasa nimis in marcore phthisico comprimens.

Lipothymia vel à depauperato sanguine phthisicorum particulis spirituosis, vel ab eodem identidem à primarum viarum cruditatibus subito inspissato deduci potest.

Sanguis enim phthisicorum ob intensam quam passus est & actu patitur fermentationem, particulis volatilibus suis depauperatur, quare vel levi accedente causâ residuas partes spirituosas deprimente, quales sunt ut plurimum cruditates primarum viarum, vel mox prægressi paroxysmi vehementes, ejus motus intestinalis & proinde circulatorius, saltem pro momento sisti debet, ut patet ex physiologicis.

Sitiunt ægri propter ariditatem faucium & linguæ, nec non salivæ falsedinem, quæ oriuntur ab æstu febrili & halitibus ubertim è pulmonibus erumpentibus. A corruptione humorum graveolentia halitûs emergit.

Oculi fiunt concavi quoniam abrasâ aut resolutâ pinguedine à propriis musculis abbreviatis retrahuntur, concidunt proinde atque minùs protuberant.

Exasperatur febris nocturno tempore propter aëris frigus & humiditatem quibus constipantur corporis pori & coercetur insensibilis transpiratio; accedit quod sanguis noctu minùs ventilatur & depuretur ob mutationem aëris & imminutam ejus virtutem elasticam, hinc magis accumulatur, calefacit, & attenuat materiam hærentem, à quâ suspenditantur salia heterogenea quæ febrem intendunt.

Sudores noctu emanant copiosi, quia remittente fermentatione serum per glandulas Cutaneas præ calore inhiantes foràs erumpit.

In mortis procinctu remittit Calor, pediculorum Rudimenta, haud destruuntur, Sed potiùs ad maturitatem perducuntur, hinc uberior illorum animalculorum genesis.

Diagnosis. Quibus phthisis proximè imminet de virium labefactione conqueri solent, cum appetitu plus minus dejecto, in artubus substantiæ carnosæ flacciditiam, item tussi siccâ & sapore in ore salso præsertim verò manè, & progrediente malo putrido,

Incipientē phthiſi tuſſis exaſperatur præcipuè veſperi aut poſt lecti introitum, invadit febris lenta, marceſcit Corpus, magisque incaleſcit à paſtu, cum pulſu ſemper celeriori & plus minus parvo.

In phthiſi confirmatâ ægri difficiliùs reſpirant, tuſſis adhuc magis ingraveſcit, veſperi minus, plus manè excreatür materiæ, quæ modò flaveſcit, modò liveſcit, quandòque non nihil foetet, & tandem tota purulenta evadit, febris etiam intenditur, majorque fit colliquatio & corporis conſumptio.

In deploratâ denique phthiſi ſymptomata omnia invaleſcunt, Capilli decidunt, ægri inter dormiendum ſudore diffluunt, & demùm diarrhæâ vel hydrope aut pulmonum infarctu è medio tolluntur.

Ex ſignis modò allatis facilè ſigna pathognomonica elici poſſunt, ubi individui illius comites occurrunt, nimirum tuſſis frequens, reſpiratio difficilis, corporis emaciatio, & febris lenta.

Omnia verò ſigna ſuperiùs allata eodem numero & ordine haud obſervantur, Sed in aliquibus plura in aliis pauciora deprehenduntur.

Sputa an ſint purulenta, optimè dignoſcitur. 1<sup>o</sup>. ex defectu co hæſionis ſtaminum ex quibus compinguntur. 2<sup>o</sup>. ex ipſorum in aquâ præcipitatione. 3<sup>o</sup>. ex innato ipſis fæore.

Signa verò cauſarum felicitiùs aſſequetur, qui & ægri temperamentum, & humorum Characteres, idque genus alia probè calluerit.

Prognôſim firmant conſideratio cauſæ, durationis, effectûs, gradûsque mali, generaliter tamen loquendo omnis phthiſis periculôſa eſt, atque difficulter curationem admittit, præ cæteris autem hæreditaria periculum portendit; leviffimam verò cenſemus illam quæ fit ab hæmoptoe per vim externam ſine vitio interno præexiſtente; neque adeò periculôſa nobis videtur inſtituenda prognôſis in eâ phthiſicos ſpecie à tuberculis mollibus ac in illâ quæ originem ſumit a Sanguine acri atque diſſoluto, in priori enim Sanguis eſt craſſior atque ad diuturniorem fermentationem ſuſcipiendam aptior, hinc affectus ille plerumque eſt chronicus, atque sæpiùs in multos annos protrahitur; ſi verò ſuperveniat Empyemati, ſemper inſanabilis exiſtit; omnis etiam phthiſis, ut ab initio difficilis curationis, ita progreſſu temporis inſanabilis eſt, illa autem in quâ ſubitò rumpitur vomica, expuitur pus album, coctum, æquale, facile, reſpondens copiâ ulceri, ſine ſiti, cum appetitu, digeſtione, ſecretione, & excretionem bonâ, difficulter quidem, tamen ſanari poteſt, è contra verò ſputa gravia, olentia, dulcia cum ſignis ultimis ſunt deſperata.

Quod verò malum hoc ſit grave, periculôſum, ac curatu difficile, in cauſâ ſunt ulcus pulmonum, curatu difficillimum, tùm inde dependens febris lenta continua, & totius corporis conſumptio, undè ſi hic affectus ſit incipiens, ſpes aliqua eſt ægrum convalitutum, dùm verò confirmatus ſeu in ſecundo Gradu exiſtit (præcipuè ſi dependeat à diſpoſitione hæreditariâ) tunc de ægro conelamatum eſt.

Curatio. Si quo in alio morbo, certè in phthiſi principiis obſtandum, & rationall ſimul & experimentalis methodo ſuccurrendum; perpennis itaque



hactenus morbi causis, diagnôsi, & prognôsi, plures inde elicimus indicationes, sanguinem affluentem revellimus atque calorem hecticum & colliquativum minuimus tempestivâ venæ sectione, extravasatum discutimus, obstructions reseramus, & morbosos humores excludimus per diaphoretica, diuretica, cathartica, & Emetica, expectoramus per Bechica, ulcerosam diathesim corrigimus per mundificantia, & balsamica, tandem opiatum pulmonum motum minuimus, sanguinis acrimoniam corrigimus, & præternaturalem illius fermentationem obtundimus.

Venæ sectio optimè fit initio antequàm facta sit pulmonum erosio, atque pro varietate subjectorum ac circumstantiarum interdum repetenda est, prout corpus vel est juvenile vel senile & viribus constat, prout etiam sanguinis abundantia vel major vel minor, effervescentia febrilis impetuosior vel remissior, & patiens evacuationibus magis vel minus assuetus; cui scopo etiam fontanellæ inserviunt, quarum ope serum detrahitur & sanguis superstes minus acer evadit.

Medicamenta verò quæ materiam peccantem & morbosam è corpore expellunt, sunt vomitoria, quæ in principio sæpè necessaria sunt, neque in ulcere pulmonum omitti debent; dum vires adhuc constant, ubi respiratio, aut materiæ excretio difficilis est, & viscera sunt firmitiora, neque Pulmones corruptos præcessit sputum cruentum, unde liquet illud remedium ob conditiones allatas sæpissimè valdè suspectum esse.

Neque minus tutò exhibentur cathartica nisi in principio ad materias contentas in primis viis educendas, à levissimo enim purgante, sæpè cum insigni virium jacturâ, & tussis vespertinæ exacerbatione copiosissimè evacuari solent phthisici, nunquàm enim materiam peccantem adedò educunt cathartica quin sanguinis acrimoniam adaugeant; si tamen laxans aliquod desideratur clysteres lenientes hoc optimè præstant, aut saltem rhabarbarum, manna, medulla cassiæ, syrupus cichorei cum rheo, vel rosarum solutius sufficiunt.

Inter diaphoretica non est contemnendi usûs decoctum radicis chinæ & sarsaparillæ, item Theriaca Andromachi, Mithridatium, Confectio Alkermes, Crocus, Lignum Sassafras, Guayac: Santal: Citrin: vel Rubr: Antimonium Diaphoreticum & similia, quæ pro majore parte non solum Diaphoretica verum etiam diuretica ab authoribus censentur, atque felici cum successu præscribuntur, modo calor hecticus nondum excedat.

Sunt & alia diuretica quibus utuntur practici, qualia sunt, aquæ minerales chalybeatæ, millepedes crudi & præparati, therebintina communis, item radices fœniculi, petroselini, eringii, helenii, exque vel crudæ vel conditæ, bacc: juniperi, lauri, cancri fluviales, &c.

Nec deficiunt incrassantia è diureticorum frigidorum farragine ut plurimum petita, ut sunt amygdalæ dulces, semina quatuor frigida majora, minora, sem: malvæ & althææ, fol: plantaginis, branchæ ursinæ, malvæ, flor: malvæ, borraginis, buglossi, violarum, his addantur composita, ut

mel simplex, violarum, syrupus althææ, violarum, mororum, capillorum veneris, tabellæ variæ edulcorantes, ut tabellæ de althea, &c.

Sylvam etiam offert medicina remediorum expectorantium seu bechicorum, nec minùs ulcerosam sanguinis dispositionem corrigentium, quæ eopiâ suâ tamen inopem sæpè reddunt medicum, & ex inani confictas in cerebro ejusdem indicationes sæpè destituunt, talia autem sunt syrupus de tussilagine, capill: vener: marrubio, hyssopo, jujub: butyrum non salitum, conserva rosarum rubrarum, pulvis antihecticus Poterii, sperma ceti &c.

Tandem sanguinis acrimoniam corrigunt ulcusque detergunt atque consolidant decocta vel infusiones ex herbis vulnerariis, ut sunt veronica, hædera terrestris, vinca per vinc: agrim: sanic: bellis: bugul: alchymill: rad: symphit: maj: millefol: taraxac: pilosell: scabios: item opobalsamum, balsamum toltutanum, peruvianum, & alia quamplurima quæ passim ab authoribus traduntur, & quorum formulis paginas implere superfedemus.

Unicum asilum, quo omnes practici refugiunt in phthisi confirmatâ lac est, attamen sedulò attendatur nùm ventriculus illud digerat, neque verò ace scat, id quod facile palàm fiet, si æger ex ejus usu nullam sentit ventriculi inflationem, nulla tormina, vel diarrhæam, aut ructus acidus.

Nec omittenda sunt opiata initio, ubi tussis nocturna sicca magis est, utpote quæ phthifici sine noxâ ferunt, diù verò eorum usus continuari debet. Si verò difficilis adest anhelitûs, ex materiâ viscidâ expectorandâ, tunc ne excretio sistatur, cautè usurpentur.

Diæta eam victûs rationem commendat, quæ causis superiùs adductis adversatur, undè ubi sanguis est acer & dissolutus, cibi sint modicè refrigerantes, incrassantes, atque tales, qui simul emplasticâ, seu glutinante virtute pollent, ut pote oriza, cremor hord: amyllum cum lacte, pocus ordinarius sit decoct: hord: cum liquirit: & passulis. Flor. Papau: & bellid: exhibeantur juscula capon: gallinar: cum simplicibus pectoralibus decocta; exulent verò vinum, cibi acres & salsi; nicotiana, motus nimius, vocis contentio, ira, terror, Venus, & si quæ alia, quæ solida & fluida in heterogeneos motus abripere, eorumque tonum, crassum, & æquilibrium turbare apta sunt.

Quantùm etiam aëris mutatio conducat, veteres docuerunt, qui suos phthificos ad Tabios mittebant, monticulum propè Neapolim in Italia, ob siccitatem aëris commendatum, & Angli adhuc hodierno tempore suos phthificos ad peregrinationes suscipiendas, adhuc satis robustos, in Galliam & Italiam mittunt, ut aërem Angliæ crassum & pluviosum, cum sicco & calido illarum regionum permutant, & sanguis crassus & fæulentus purior reddatur, è contra verò qui sanguinem habent acrem & dissolutum pulmonesque rarioris texturæ, iis maximè convenit aër pinguis & aura urbium fumosa, ut sanguis deliquium passus à sulphuribus crassis consistentiam majorem accipiat, figatur, & sic pulmonum textura firmior

reddatur, unde talia loca valdè salubria ex multorum relatione, imo non rarò sanativa existunt: quid vetat itaque quin & ego non minùs antiquorum experièntiis, quam neotericorum rationibus suffultus, concludam.

*ERGO Phthisi Pulmonari mutatio aëris.*

**DISPUTATURI,**

**PROFESSORES REGII.**

R. D. Franciscus Chicoyneau *Can-*  
*cellarius & Judex.*

R. D. Joannes Bezac *Vicedecanus.*

R. D. Petrus Chirac.

R. D. Petrus Magnol.

R. D. Antonius Deidieri

R. D. Petrus Rideux.

R. D. Antonius Magnol, *Patris*  
*Coadjutor.*

*Doctores Aggregati.*

R. D. Henricus Haguénot.

R. D. Joannes Henricus Haguénot  
*Patris Coadjutor.*

*Doctores Ordinarii.*

M. Mauritius Pelerin.

M. Eustachius Marcot.



M. Antonius Fizes.



M. Bartholomæus Pascal.

*Propugnabit in Augustissimo Monspeliensis Appollinis Fano, Deo ju-*  
*vante & auspice Deiparâ, FRANCISCUS PHILIPPUS JOSEPHUS*  
*VESPERLEDER Solodoranus Helvetius, die mensis*  
*Februarii Anno. R. S. H, 1713. ab horâ 8. ad meridiem.*

---

**MONSPELII,**  
Apud HONORATUM PECH, Regis, Universitatis, Cleri  
& Urbis Typographum 1713.

Handwritten text at the top of the page, likely bleed-through from the reverse side.

AN CO THAM TAYNANTU ANTIQVIV

DISPUTATIUR.

PROFESSORES REGII

Handwritten text in the middle section, possibly names of professors or dates.

Handwritten text in the lower middle section.

Handwritten text in the bottom middle section.

MONSIEUR  
HONORABLE M. DE LA ROCHE, ROYAL, UNIVERSITAIRE, CLER  
& Libraire Regioy de Paris.